



Modus Operandi

Crema de Drenaje Linfático

Concepción Pérez García

Composición:

<i>Conium maculatum</i> 4 DH	8,4 %
E.F. de <i>Colchicum autumnale</i>	3 %
E.F. de <i>Digitalis purpurea</i>	2,1 %
E.F. de <i>Hyosciamus niger</i>	2,1 %
E.G. (1:2) de <i>Calendula officinalis</i>	0,42 %
Hidrovitón	4,5 %
Jugo de Aloe vera	2 %
Vitamina E éster glicérico	1 %
Excipiente o/a c.s.p.	100 g

Excipiente o/a:

Fase oleosa:

Neo P.C.L. o/a	22 %
Tefose 2561	1,5 %
Aceite de germen de trigo	2 %
Vitamina F éster	1 %
Butilhidroxitolueno	0,01 %
Palmitato ascorbilo	0,1 %

Fase acuosa:

Sorbitol	4 %
Glicerina	4 %
Kathon	0,1 %
Agua destilada	58 %

Dirección de contacto:

Concepción Pérez García
San Jerónimo, 52 · Granada
Tels.: 958 20 01 30 · Fax.: 958 20 56 17
E-mail: c.perez.003@correo.recol.es

Vía de administración:

Uso externo.

Acción farmacológica:

Crema formulada a partir de una serie de extractos de plantas medicinales con acción sobre los ganglios inflamados además de una acción espasmolítica, analgésica, antiséptica y cicatrizante.

Indicaciones:

Inflamación ganglionar. Linfoestancamiento provocado por intervenciones quirúrgicas sobre todo en mastectomías.

Edemas, elefantiasis.

Drenaje linfático tras liposucción.

Contraindicaciones:

Pacientes alérgicos al conservante.

Esclerosis múltiple.

Dosificación:

Aplicar mediante suave masaje durante uno, dos, o tres minutos una cantidad pequeña de crema.

Precaución: Evitar el contacto con las mucosas.

Utillaje a emplear:

Vasos de precipitado, mortero, varillas de vidrio, agitador magnético, balanza de precisión, baño maría, espátula, pistilo.

Modus operandi:

Se calienta por separado a baño de maría la fase oleosa y la fase acuosa. Una vez fundida la fase grasa y calentadas ambas aproximadamente a 60° C, se vierte la fase acuosa sobre la oleosa, agitando de forma continua con un homogeneizador hasta enfriamiento de la mezcla. Una vez fría se añade Hidrovitón 4.5%, Aloe vera jugo 2% y vitamina E 1%. Posteriormente se añaden los extractos hasta completa interposición y formación de una crema homogénea.

Fecha de caducidad:

Seis meses.

Condiciones de conservación:

En lugar seco y protegido de la luz.