

# CRANBERRY CYST TABLETAS



## PRESENTACIÓN

Caja de 30 tabletas de 750 mg., en blíster.

## MODO DE USO

2 tabletas al día con abundante agua, preferiblemente con las comidas. En fases agudas se puede practicar tratamiento de choque con 4 tabletas al día. Tratamiento mínimo de 2 a 3 meses.

## NO CONTIENE

Gluten, azúcar añadido, conservantes añadidos, colorantes artificiales, aromas.

## COMPONENTES

- ARÁNDANO ROJO AMERICANO (CRANBERRY), frutos, extr. seco tit. 30% aporte de proantocianidinas 20 mg (PACS)
- GAYUBA, hojas, extr. seco tit. 20% aporte arbutina 10 mg
- ORTOSIFÓN, hojas, extr. seco 0,2% aporte sinensetina 0,1 mg
- POMELO, semillas, extr. seco 4:1
- VARA DE ORO, planta con flores, extr. seco 10:1

## ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No superar la dosis diaria recomendada.
- El producto no debe considerarse como sustituto de una dieta variada.
- No tomar durante el embarazo.
- No aconsejado junto con terapia antibiótica.



INTEGRADORES  
DIETÉTICOS

