

STOPDEP



cápsula RETARD



1^{al} día

PRESENTACIÓN

Caja de 30 cápsulas Retard de 764 mg. (contiene cada una 4 pequeños comprimidos, 2 de absorción estomacal y 2 de absorción intestinal), en blíster.

MODO DE USO

1 cápsula Retard al día (preferiblemente por la mañana) con abundante agua. Tomar alejada de comidas o bebidas proteicas.

NO CONTIENE

Gluten, azúcar añadido, conservante añadido, aroma artificial, colorante artificial, OGM.

COMPONENTES

- HIPÉRICO, sumidad florida, extr. seco tit. 0,3% hipericina (0,7 mg)
- L-TRIPTÓFANO
- MAGNESIO, óxido
- L-FENILANINA
- L-TIROSINA
- VITAMINA PP (NIACINA)
- VITAMINA B6

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No superar la dosis diaria recomendada.
- El producto no debe considerarse como sustituto de una dieta variada.
- Para las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia consultar al Profesional de la Salud.
- No tomar si se trata con IMAOS, ISRS, (inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina).
- Puede producir, esporádicamente, fotosensibilidad (en personas sensibles).
- Vigilar la ingesta de alimentos ricos en tiramina durante el tratamiento.



INTEGRADORES
DIETÉTICOS

